

您可能會重復閱讀該單張，請保存好直到您全部用完該產品。該產品中的早晚方可單獨購買。

Reflux-ease I 反酸停 I

支持消除反酸伴有腹脹以及相關的 2 組以上下列症狀：


◆易生氣、沮喪 ◆緊張，焦慮 ◆思緒繁雜，難於入睡 ◆消化不良 ◆目赤 ◆口苦 ◆耳鳴

反酸停 I (Reflux-ease I) 使用指南：

適用成人。早飯後服用 1-2 粒早方 (Morning Formula) 膠囊，晚飯後服用 1-2 粒晚方 (Night Formula) 膠囊。如不見明顯效果，增加早晚方各到 2-4 粒膠囊直到有穩定效果，然後恢復到 1-2 粒劑量。

服用日程： 1-2 個月，然後休息 1 個月。如有必要，再開始新的療程。

如果症狀介於**反酸停 I (Reflux-ease I)** 和**反酸停 II (Reflux-ease II)** 之間，可交替使用它們：



交替使用**反酸停 I (Reflux-ease I)** 和**反酸停 II (Reflux-ease II)**，每種各 5 天。重復這個循環直到有明顯效果，然後休息 1 個月。如有必要再開始新的療程。

緊張和焦慮是頑固型反酸的根源。對頑固型反酸，建議使用下列長期綜合方案先解決緊張焦慮：



交替使用**放鬆 I (Tension-free I)** (10 天) 和**脾復優 (Better Digestion)** (5 天)，重復這個循環直到有明顯效果，然後休息 1 個月。如有必要再開始新的療程。

特別注意事項：

- 不要與鎮靜藥物同用。

日常保健提示：

- 晚上睡覺前，做 15 分鐘放鬆散步。

免責聲明：本單頁內容以提供消費者產品信息為目的，不是要取代由醫生提供給個人的醫療診斷、處方、預防及治療服務。如症狀持續，請尋求醫生諮詢。