

您可能會重復閱讀該單張，請保存好直到您全部用完該產品。該產品中的早晚方可單獨購買。

Reflux-ease II 反酸停 II

支持消除反酸及相關的 2 組以上下列症狀：


- ◆胃反酸，焦躁伴有多食善飢
- ◆容易大便秘燥
- ◆緊張、煩躁
- ◆經常口腔，唇，舌潰瘍
- ◆消化不良
- ◆口臭，口干

反酸停 II (Reflux-ease II) 使用指南：

適用成人。早飯後服用 1-2 粒早方 (Morning Formula) 膠囊，晚飯後服用 1-2 粒晚方 (Night Formula) 膠囊。如不見明顯效果，增加早晚方各到 2-4 粒膠囊直到有穩定效果，然後恢復到 1-2 粒劑量。


服用日程：1-2 個月，然後休息 1 個月。如有必要，再開始新的療程。

如果症狀介於反酸停 I (Reflux-ease I) 和反酸停 II (Reflux-ease II) 之間，可交替使用它們：



交替使用反酸停 I (Reflux-ease I) 和反酸停 II (Reflux-ease II)，每種各 5 天。重復這個循環直到有明顯效果，然後休息 1 個月。如有必要再開始新的療程。

緊張和焦慮是頑固型反酸的根源。對頑固型反酸，建議使用下列長期綜合方案先解決緊張焦慮：



交替使用放鬆 II (Tension-free II) (10 天) 和脾復優 (Better Digestion) (5 天)，重復這個循環直到有明顯效果，然後休息 1 個月。如有必要再開始新的療程。

日常保健提示：

- 晚上睡覺前，做 15 分鐘放鬆散步。

免責聲明：本單頁內容以提供消費者產品信息為目的，不是要取代由醫生提供給個人的醫療診斷、處方、預防及治療服務。如症狀持續，請尋求醫生諮詢。