

您可能會重復閱讀該單張，請保存好直到您全部用完該產品。該產品中的早晚方可單獨購買。

Stress-ease II 抗壓 II 支持人體自愈能力，從而減緩壓力以及與之相關的 2 組以上下列症狀：

- ◆有壓力，郁悶不舒，煩躁不安易怒 ◆胸脅脹滿 ◆經常口、唇、舌潰瘍 ◆潮熱盜汗，面色潮紅
- ◆容易大便干燥或小便赤黃


抗壓 II (Stress-ease II) 使用指南：

適用成人。早飯後服用 1-2 粒早方 (Morning Formula) 膠囊，晚飯後服用 1-2 粒晚方 (Night Formula) 膠囊。如不見明顯效果，增加早晚方各到 2-4 粒膠囊直到有穩定效果，然後恢復到 1-2 粒劑量。

如長期服用 (連續服用超過 3 周以後)，**抗壓 II (Stress-ease II)** 需要和**脾復優 (Better Digestion)** 協同使用。交替使用**抗壓 II (Stress-ease II)** 5 天和**脾復優 (Better Digestion)** 2 天，並重復這個循環。

服用日程： 1-2 個月，然後休息 1 個月。如有必要，再開始新的療程。

針對與壓力相關的頑固型情況的長期解決方案：



交替使用上述 3 個**抗壓 (Stress-ease I, II, III)** (每種 7 天) 和**脾復優 (Better Digestion)** (2-3 天)。重復這個循環直到有明顯效果，然後休息 1-2 個月。如有必要再開始新的療程。

日常保健提示：

- 當你感覺有壓力時，做深呼吸。
- 晚上睡覺前，做 5 分鐘放鬆散步。
- 保持規律性的適量運動，以微出汗為宜。

免責聲明：本單頁內容以提供消費者產品信息為目的，不是要取代由醫生提供給個人的醫療診斷、處方、預防及治療服務。如症狀持續，請尋求醫生諮詢。